

# 신형 코로나 바이러스 감염증에 관한 홋카이도의 단계분류 (개요)

## 목적

- 백신 접종 등이 진행되고 있는 가운데 의료체제에 대한 포화상태가 생기지 않는 수준으로 감염을 억제하고 일상생활과 사회경제 활동의 회복을 촉진한다.
- 신규 감염자수 등을 주시하면서 의료체제에 대한 포화상태에 중점을 두고 감염상황에 대한 분석 및 평가 후 대책을 강구하다

## 각 단계의 분류

<b>단계 0</b>	(감염자제로 단계) 신규감염자수 제로를 유지할 수 있다.
<b>단계 1</b>	(유지 단계) 일반의료의 안정적 확보로 인해 코로나 상황에 대응할 수 있다.
<b>단계 2</b>	(경계강화 단계) 신규감염자수의 증가로 인해 의료의 부하가 생기기 시작하고 있다.
<b>단계 3</b>	(대책강화 단계) 일반의료를 상당 정도 제한해야 한다.
<b>단계 4</b>	(피하고 싶은 단계) 일반의료를 크게 제한해도 신형 코로나 바이러스에 대응할 수 없다.

## 지역을 대상으로한 운용

- 단계 운용은 원칙적으로 도 전역으로 하면서 삿포로시를 대상으로 한 운용을 실시한다. 삿포로 시내에 대한 대책은 삿포로시의 통근 및 통학으로 인한 감염 확산 등도 고려하여 주변 시정촌을 대상으로 하는 것도 검토
- 지역의 감염 상황 등을 모니터링하고, 감염 확산 등을 고려한 후, 지역을 한정된 대책을 검토

# 단계이행지표 및 대응기준

단계	이행지표	대응기준
0	일정기간(2주간 정도) 신규 감염자수 제로인 날이 계속됨	○ 기본적 감염방지행동에 대한 실천 촉진
1	신규감염자가 산발적으로 발생	○ 특히 감염위험이 높은 상황 및 행동에 유의하도록 기본적인 감염 방지 행동의 실천을 촉구
2	①「병상(또는 중증병상) 사용률」이 20%를 초과 ②「신규 감염자수」가 10만명당 15명/주를 초과 ③「요양자 수」가 10만명당 20명을 초과  ①~③ 모두를 충족	○ 감염위험이 높은 상황 및 행동을 피하도록 요청 등 ○ 일정기간(2주간 정도) 감염확산이 지속될 경우에는 추가 제한에 대한 요청을 실시하는 동시에 만연 방지 등 중점조치를 국가에 요청할 것을 검토 ○ 더욱 감염확산이 지속될 경우에는 단계3으로의 이행도 염두에 두고 긴급사태 조치의 실시에 대해 국가와 협의
3	「병상(또는 중증병상) 사용률」이 50%를 초과	○ 긴급사태 조치 또는 만연방지 등 중점조치 하에서 강한 제한을 요청
4	「병상 사용률」이 100%를 초과할 우려가 있음	○ 더 강력한 제한을 수반하는 요청  (예) 외출 자제, 음식점 휴업, 시설 사용 정지, 이벤트 중지, 대중교통기관의 운행 시간표 대폭 재검토, 직장 출근 인원 대폭 삭감 등

◆ 단계이행 판단에 있어서는 장래 병상 수를 예측하는 방식과 더불어 감염경로 불명 비율이나 양성률 등 다양한 지표를 모니터링 하여, 감염 상황 등에 대한 분석 및 평가를 실시한다.

◆ 변이주의 영향으로 인한 감염확산이 급속히 진행되는 경우 등 필요에 따라 단계이행이나 대책을 앞당긴다.